

Příbalová informace: informace pro uživatele

Apulco 0,28 % / 9,5 % medicínální plyn, stlačený
Apulco 0,28 % / 14 % medicínální plyn, stlačený

carbonei monoxidum (CO), helium (He)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Apulco a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apulco používat
3. Jak se přípravek Apulco používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Apulco uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Apulco a k čemu se používá

Tento medicínální plyn je medicínální plyn určený výhradně k diagnostickým účelům. Používá se k diagnostickému vyšetření plicních funkcí: stanovení difuzní kapacity resp. tzv. transfer faktoru (schopnosti plic vyměňovat plyny).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apulco používat

Nepoužívejte přípravek Apulco:

- pokud Váš lékař nepožaduje, abyste podstoupil(a) vyšetření plicních funkcí.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Apulco k vyšetření plicních funkcí se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Apulco

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Apulco s jídlem, pitím a alkoholem

Jestliže použijete tento medicínální plyn, nesmíte být ve stavu, který by Vám bránil správně podstoupit vyšetření plicních funkcí podle pokynů lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického pracovníka.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete tento medicínální plyn inhalovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití tohoto medicínálního plynu během vyšetření plicních funkcí by nemělo mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Apulco používá

Inhalujte tento medicínální plyn pouze během diagnostického vyšetření plicních funkcí, a to přesně podle pokynů svého lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického pracovníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Délku trvání diagnostického vyšetření plic a četnost jeho opakování může určit pouze Váš lékař nebo ošetřující zdravotnický pracovník.

4. Možné nežádoucí účinky

Během inhalování tohoto medicínálního plynu při vyšetření plicních funkcí se mohou velmi nepravděpodobně projevit nežádoucí účinky: závratě, bolest na hrudi a pocit dezorientace. Pokud se u Vás kterýkoli z příznaků tohoto druhu během použití tohoto medicínálního plynu projeví, je třeba inhalaci ihned ukončit a zajistit lékařské ošetření.

Po inhalaci medicínálního plynu může být zapotřebí vzorek žilní krve k provedení krevního rozboru.

5. Jak přípravek Apulco uchovávat

Láhve na stlačený plyn je nutno uchovávat zastřešené a chráněné před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Nevyhazujte tento medicínální plyn, ale vraťte ho dodavateli. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Apulco obsahuje

Léčivými látkami jsou carbonei monoxidum a helium.

Dalšími složkami jsou dusík a kyslík.

Jak přípravek Apulco vypadá a co obsahuje toto balení

Je to bezbarvý plyn, bez zápachu, který je stlačený v hliníkových láhvích na stlačený plyn. Válcová část láhve je bílá a její horní zaoblená část je jasně zelená.

Každá láhev na stlačený plyn je opatřena následující tabulkou:

Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 9,5 %

Kapacita v litrech	Plnicí tlak (bar)	Počet litrů plynu
5	200	904
10	200	1808
20	200	3615
40	200	7231

Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 14 %

Kapacita v litrech	Plnicí tlak (bar)	Počet litrů plynu
5	200	897
10	200	1794
20	200	3589
40	200	7178

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

J. Š. Baara 2063/21

405 02 Děčín

Česká republika

Výrobce

S.E. de Carburos Metálicos S.A.

Pol Nord-Este C-35, Km 59

08470 Sant Celoni (Barcelona)

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Apulco

Německo: Apulco CoHe 0,28% 9,5%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet

Německo: Apulco CoHeMax 0,28% 14%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet

Nizozemsko: Apulco CoHe 0,28%/9,5%, medicinaal gas, samengeperst

Nizozemsko: Apulco CoHeMax 0,28%/14%, medicinaal gas, samengeperst

Portugalsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gás medicinal, comprimido

Portugalsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gás medicinal, comprimido

Slovenská republika: Apulco CoHe 0,28 % / 9,5 % medicínálny plyn, stlačený

Slovenská republika: Apulco CoHeMax 0,28 % / 14 % medicínálny plyn, stlačený

Španělsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gas comprimido medicinal

Španělsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gas comprimido medicinal

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 7. 2021